Kleinere Ponys – Stockmaß 90–130 cm/GV 0,3–0,7	Pferderasse Gewicht in kg	Umrechnung zu GV (500 kg)
Shetlandpony	100–200	0,2–0,4
Welsh-Pony	220–300	0,4–0,6
Deutsches Reitpony	280–350	0,6–0,7
Größere Ponys, Kleinpferde – Stockmaß 130–160 cm/GV 0,7–1,0		
Deutsches Reitpony, groß	350–420	0,7–0,8
Islandpferd	330–450	0,7–0,9
Vollblut-Araber	350–450	0,7–0,9
Shagya-Araber	370–500	0,7–1,0
Haflinger	420–520	0,8–1,0
Norwegisches Fjordpferd	420–500	0,8–1,0
Appaloosa, Pinto mittelgroß	400–500	0,8–1,0
Englisches Vollblut	400–500	0,8–1,0
Quarter Horse	450–550	0,9–1,1
Großpferde – Stockmaß 160–190 cm/GV 1,0–1,3		
Leichtes Warmblut	500–550	1,0–1,1
Schweres Warmblut	550–650	1,1–1,3
Appaloosa, Pinto groß	500–650	1,0–1,3
Kaltblutpferde – Stockmaß 140–180 cm/GV 1,0–1,7		
Schwarzwälder Kaltblut	500–600	1,0–1,2
Großes Kaltblut	700–850	1,4–1,7
Esel – Stockmaß 80–160 cm/GV 0,3–0,9		

*Gewichtsangaben nach LÖBBING (2003), MEYER & COENEN (2002).

Tabelle verändert nach SEIFERT et al. (2006).

		Standweide (Vegetationsperiode)			Kurzzeitweide					Langzeitweide	
Biotoptyp	**Besatzstärke GV pro Hektar**	**Benötigte Flächengröße für ein kleines Pony (zirka 0,5 GV) in ha**	**Benötigte Flächengröße für ein größeres Pony oder Kleinpferd (zirka 0,8 GV) in ha**	**Benötigte Flächengröße für ein Großpferd oder Kaltblutpferd (zirka 1,2 GV) in ha**	**Zahl und Dauer der Weidegänge (in Wochen)**	**Besatzdichte (GV pro Hektar)**	**Anzahl kleine Ponys pro Hektar (zirka 0,5 GV)**	**Anzahl größere Ponys oder Kleinpferde pro Hektar (zirka 0,8 GV)**	**Anzahl Großpferde oder Kaltblutpferde pro Hektar (zirka 1,2 GV)**	**Weidedauer (in Wochen)**	**Besatzdichte GV pro Hektar**
Niedermoore, Kleinseggenriede und Feuchtheiden	< 0,1–0,2	2,0–5,0	4,0–8,0	6,0–12,0	1 x je 1–2 Wo.	1–2	2–4	1–3	1–2		
Kohldistelwiesen, Binsenwiesen	0,3–0,6	1,0	1,0–2,5	2,0–4,0	1–2 x je 1–2 Wo.	4–8	8–16	5–10	3–7		
Feuchtwiesen (Hochstaudenfluren)	0,3–0,6	1,0	1,0–2,5	2,0–4,0	1–2 x je 1–2 Wo.	4–8	8–16	5–10	3–7		
Artenarmes Feuchtgrünland, Flutrasen	0,6–1,0	0,5–1,0	1,0	1,0–2,0	2–3 x je 1–2 Wo.	8–12	16–24	10–15	7–10		
Artenreiche Glatthaferwiesen	0,6–1,2	0,5–1,0	1,0	1,0–2,0	1–2 x je 1–2 Wo.	8–15	16–30	10–19	7–12		
Artenreiche Weiden mittlerer Standorte (traditionell beweidet)	0,6–1,2	0,5–1,0	1,0	1,0–2,0	1–2 x je 2–3 Wo.	6–12	12–24	7–15	5–10	6–9	2,0–4,0
Artenreiche Bergwiesen und artenreiche Bergweiden	0,3–0,6	1	1,0–2,5	2,0–4,0	1–2 x je 1–2 Wo.	4–8	8–16	5–10	3–7		
Artenarme Wiesen mittlerer Standorte	1,0–2,0	0,25–0,5	0,5–1,0	0,5–1,0	2–3 x je 1–2 Wo.	9–18	18–36	11–22	7–15		
Artenarme Weiden mittlerer Standorte (traditionell beweidet)	1,0–2,0	0,25–0,5	0,5–1,0	0,5–1,0	2–3 x je 2–3 Wo.	7–14	14–28	9–17	6–12	6–9	4,0–7,0
Artenreiche bodensaure Magerrasen	0,1–0,4	1,0–5,0	2,0–8,0	3,0–12,0	1 x je 1–2 Wo.	2–5	4–10	3–6	2–4	6–9	0,3–1,2
Heiden, Zwergstrauchheiden, artenarme bodensaure Magerrasen	0,1–0,3	1,5–5,0	2,5–8,0	4,0–12,0	1 x je 1–2 Wo.	2–4	4–8	3–5	2–3	6–9	0,3–0,9
Artenreiche Halbtrockenrasen	0,2–0,5	1,0–2,5	1,5–4,0	2,5–6,0	1–2 x je 1–2 Wo.	3–6	6–12	4–7	2–5	6–9	0,5–1,5
Artenarme Halbtrockenrasen (durch Verbrachung verarmt)	0,4–0,7	1,0	1,0–2,0	2,0–3,0	1–2 x je 1–2 Wo.	5–9	10–18	6–11	4–7	6–9	1,0–2,5
Sandrasen, Sandheiden	< 0,1–0,2	2,5–5,0	4,0–8,0	6,0–12,0	1–2 x je 1–2 Wo.	1–3	2–6	1–4	1–2		

Lebensraum (1 ha)	Dauer in Wochen	Kleinpferd	Pony	Großpferd	Herden
Entspricht in GV			0,3–0,7		
Empfindliche Lebensräume (zum Beispiel Sandmagerrasen)	1–3	Unterbeweidet	Unterbeweidet	Vollständig beweidet	
	3–5	Unterbeweidet	Vollständig beweidet	Überbeweidet	
	5–7	Vollständig beweidet	Überbeweidet	Degradiert	
Mittlere Standorte	1–3				
	3–5				
	5–7				
	7–9				
	9–11				